# دراسة تكشف عن بطء في إيصال التمويل إلى مناطق تفشي «إيبولا»

الاستجابة الدولية لأزمة «إيبولا» في غرب أفريقيا كانت أكثر سخاءً مما كان متوقعاً، لكن توزيع الموارد على المناطق التي أصابها الوباء بطيء للغاية، وفقاً لدراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية BMJ

فيروس «إيبولا» تفشي الوباء أدى إلى مقتل أكثر من 8.800 شخص منذ بدايته ديسمبر 2013




* دول دفعت أو ملتزمة بشدة
ECHO = المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية







أ- الأعراض: حمى، صداع، آلام في المفاصل والعضلات، فقدان الشهية

ب- عاصفة السيتوكين: خلايا المناعية تعلق في حلقة مستمرة، مفرزة مستويات عالية جداً من السيتوكينات - البروتينات التي تسبب التهابات



ج- الصدمة الإنتانية: الخلايا المصابة تنفصل عن شرايين الدم، مسببة فقدان كميات ضخمة من الدم في سائر أنحاء الجسم، وفشل في عمل الكلى والكبد

المصدر: BMJ, wire agencies

© GRAPHIC NEWS