

تحظر وزارة التغير المناخي والبيئة اصطياد بعض أنواع أسماك القرش، وذلك بموجب اتفاقية سايتس (CITES) العالمية، ويجب على من يصطادها بطريقة غير مقصودة إعادتها فوراً إلى مياه البحر، وينع كذالك تداول أسماك القرش الحية التي تصطاد في مياه الدولة بدون تصريح خاص تصدره الوزارة.

أبو مطرقة الانسيابي Sphyrna zygaena

معرضة للانقراض

NT VU EN CR

الرأس منح مع عدم وجود فص فاصل في مقدمة الرأس



الزعنفة السفلية أكبر بكثير من الزعنفة الظهرية الثانية
الزعنفة الصدرية قصيرة وعريضة، يمكن أن تحتوي على حواف داكنة على الجانب السفلي

أقصى طول حوالي 500

مهددة بالانقراض

NT VU EN CR

الرأس مستقيم مع وجود فص فاصل في مقدمة الرأس



قرش أبو مطرقة الكبير Sphyrna mokarran

الزعنفة الظهرية الأولى منجلية الشكل عالية جداً
الزعنفة الظهرية الثانية متساوية للزعنفة السفلية

الزعنفة البطنية منجلية الشكل

أقصى طول 610 سم

معرضة للانقراض

NT VU EN CR

الزعنفة الظهرية دائرية الشكل مع وجود لون أبيض على الأطراف




الزعنفة الظهرية الثانية ليست على مستوى الزعنفة السفلية

أقصى طول 400 سم

مهددة بالانقراض

NT VU EN CR

الرأس منح مع وجود فص فاصل في مقدمة الرأس



قرش أبو مطرقة الصدفي Sphyrna lewini

الزعنفة الظهرية الثانية تقع مباشرة فوق منتصف الزعنفة السفلية أو خلفها قليلاً

الزعنفة السفلية أكبر من الزعنفة الظهرية الثانية

أقصى طول: 430 سم

معرضة للانقراض

NT VU EN CR

اللون الرمادي يغطي الجسم مع وجود نقاط بيضاء بشكل مستقيم على المنطقة الظهرية



الزعنفة الذيلية موقع الزعنفة الظهرية الثانية على نفس مستوى الزعنفة الشرجية

أقصى طول 2000 سم

عائلة أسماك المنشار (أبوسيف) Prestidae spp

عائلة أسماك المنشار «أبوسيف» تحتوي على الأجناس التالية:
• Prestidae spp ويحتوي على ستة أنواع مهددة بالانقراض
• Anoxyristis spp يحتوي على نوع واحد مهدد بالانقراض
يحمل ما بين 23 و 37 زوجاً من الأسنان




أقصى طول: 400-700 سم

مهددة بالانقراض

NT VU EN CR

الرأس منح مع وجود فص فاصل في مقدمة الرأس



الزعنفة السفلية أكبر من الزعنفة الظهرية الثانية

أقصى طول: 430 سم

معرضة للانقراض

NT VU EN CR

اللون الرمادي يغطي الجسم مع وجود نقاط بيضاء بشكل مستقيم على المنطقة الظهرية




الزعنفة الذيلية موقع الزعنفة الظهرية الثانية على نفس مستوى الزعنفة الشرجية


أقصى طول 2000 سم

يتم اصطياد أسماك القرش بما يقارب 28-73 مليون سمكة كل عام للاستفادة من زعانفها لتحضير حساء الزعانف، ولأسباب أخرى منها:

- الصيد العرضي
- الحصول على اللحوم والجلود وتذكارات الصيد
- الحصول على زيت الكبد في صناعة مستحضرات التجميل
- المشاركة في العروض المائية والرياضية



لماذا؟!



تراجع نمو أسماك القرش

حوالي 15

نوعاً من أسماك القرش في المحيطات مهددة بالانقراض

يجب علينا المساهمة في الحفاظ على أسماك القرش كمورد طبيعي غني يقدم الكثير من الخدمات البيئة

لوحظ في آخر 20 سنة تراجع تجمعات أسماك القرش

90%

تموت 100.000.000 سمكة قرش سنوياً أي بمعدل 11.000 سمكة قرش في الساعة



البيئة

معرضة للانقراض

NT VU EN CR

تتواجد بكثرة قريباً من السواحل الشاطئية الضحلة، إضافة إلى المناطق البعيدة عن الشاطئ

أسماك المانتا تنغوص إلى أعماق تصل حتى 1000 متر

وجود كتلة كلسية عند منطقة الذيل

أقصى عرض 900 سم

سمك شيطان البحر المحيطي (المانتا العملاقة)

عادة حواف سوداء
وجود لون أسود على الفتحات الخيشومية الخامسة
زعانف رئيسية طويلة
وجود لون أبيض على جانبي الظهر

وجود كتلة كلسية عند منطقة الذيل

مانتا الشعاب المرجانية Manta alfredi

وجود بقع سوداء على المنطقة السفلى من الجسم وبين الفتحات الخيشومية
عدم وجود شوكة ذيلية أو كتلة كلسية عند منطقة الذيل
فم

تتواجد على الجزر القريبة من الشاطئ ومعظمها ترتبط بمناطق الشعاب المرجانية.

أقصى عرض: 500 سم